

INFORMAZIONI UTILI PER ESAMI CON INIEZIONE INTRAVASCOLARE DI MEZZO DI CONTRASTO A BASE DI GADOLINIO

Cognome **Nome** **data di nascita** / / **peso**

Anamnesi positiva per

precedenti reazioni avverse a MDC A BASE di Gadolinio *SI* *NO*

se ha risposto SI descrivere il tipo di reazione ed eventuale terapia, se possibile allegare eventuale documentazione:

anafilassi idiopatica

mastocitosi

angioedema ricorrente in atto

orticaria in atto

asma bronchiale non controllato da terapia, ovvero nelle ultime 4 settimane ha avuto:

- sintomi più di 2 volte/settimana? *SI* *NO*

- ogni notte si sveglia per l'asma? *SI* *NO*

- ha utilizzato il salbutamolo (Ventolin/Broncovaleas) più di 2 volte/sett? *SI* *NO*

- ha avuto limitazioni dell'attività a causa dell'asma? *SI* *NO*

Se ha selezionato una delle patologie o ha risposto SI ad una delle domande, la possibilità di eseguire l'esame sarà definibile solo in Radiologia e pertanto potrà essere rimandato in attesa di una consulenza dello Specialista allergologo o di una valutazione del Medico curante o dello Specialista di riferimento.

Si rammenta che secondo le Linee guida di riferimento ESUR (10.0) la premedicazione non è raccomandata.

• *E' sottoposto a trattamento emodialitico* *SI* *NO*

Se SI, specificare in quali giornate :

Secondo le Linee guida ESUR 10.0 **non è necessario il dosaggio della creatinemia** fatta eccezione per lo studio della patologia del fegato e delle vie biliari con mezzo di contrasto a parziale escrezione biliare.

In questo caso è obbligatorio, al momento dell'esecuzione dell'indagine radiologica, presentare il referto del dosaggio della creatinemia eseguito in data non antecedente a 3 mesi.

Data / /

Firma del Medico Radiologo

Raccomandazioni generali per esami programmati (non eseguiti in emergenza):

- **Il digiuno da cibi solidi non è necessario**; va eventualmente osservato solo per alcuni protocolli di esami (per esempio studi di cuore e addome) come esplicitato nell' informativa e modulistica relativa alla loro preparazione;
- **continuare l'assunzione di eventuali farmaci** (salvo diversa indicazione da parte del Medico curante) **e la normale assunzione di acqua** (è importante essere ben idratati);
- portare in visione la **documentazione clinica precedente, incluse le immagini radiologiche**;
- si rammenta che alcuni valori degli esami emato-chimici nelle 24 ore dopo l'esame potrebbero essere alterati.

Le indicazioni fornite sul presente modulo fanno riferimento a linee guida internazionali (ESUR 10.0 -2018)