

**CONSENSO INFORMATO**  
**ALL'IMPIEGO DEL MEZZO DI CONTRASTO IN TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA**

Il medico che La segue ha ritenuto opportuno proporLe di sottoporsi ad una tomografia computerizzata detta anche TC. L'indagine radiologica a cui sta per sottoporsi utilizza Raggi "X" ed un sistema di computer per poter ottenere delle immagini del Suo corpo e dei Suoi organi interni. Il Suo medico ritiene che questo esame fornirà delle informazioni per capire meglio il Suo problema clinico e quindi trattarlo con la terapia più opportuna. Durante l'esame TC è previsto che Le venga somministrato un mezzo di contrasto, ossia un liquido opaco ai Raggi "X" che ci permetterà di vedere meglio i Suoi organi: esso viene iniettato in vena. Le complicanze sono molto rare e possono essere legate all'uso del mezzo di contrasto.

Si possono verificare in una percentuale di casi non superiore all'1% stravasi del mezzo di contrasto nel sottocutaneo, soprattutto nei pazienti con vene fragili o danneggiate.

Per quanto riguarda le complicanze legate all'impiego di contrasto si precisa come i mezzi di contrasto attualmente a disposizione sono prodotti estremamente sicuri e sono stati somministrati a milioni di pazienti ma occasionalmente possono dare dei problemi.

I medici ed il personale paramedico del servizio di Radiologia sono addestrati per curare nel modo migliore queste reazioni nel caso esse si verificano. I tipi di reazione che si manifestano in casi sporadici sono:

1. reazioni minori come starnuti o nausea: queste reazioni non richiedono alcuna terapia e la probabilità che esse si verificano è di circa 1 caso su 100 pazienti (1%)
2. reazioni severe: queste reazioni richiedono di solito una terapia medica e comprendono ad esempio difficoltà respiratorie, battiti cardiaci irregolari, convulsioni o perdita di coscienza. La probabilità che si verifichi una reazione di questo tipo è di circa 1 caso su 6000 pazienti (0,017%). Assai raramente, succede con molti farmaci, i mezzi di contrasto possono causare il decesso. La probabilità che ciò avvenga è di circa 1 caso su 100.000 pazienti (0,00001%)
3. Vi è anche la possibilità che il mezzo di contrasto provochi un peggioramento, di solito transitorio, della funzionalità dei reni (circa nel 3% dei pazienti) che si può verificare soprattutto nei pazienti che hanno già dei problemi renali e se sono anche diabetici.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ dichiara di essere stato informato esaurientemente in merito all'esame radiologico da eseguire, sulle indicazioni e gli eventuali rischi e conseguenze che da esso ne possono derivare. Confermo di aver ben compreso le spiegazioni che mi sono state fornite e **ACCONSENTO** all'esecuzione dell'esame ed alla somministrazione del Mezzo di Contrasto laddove indicato.

STATO DI GRAVIDANZA (CERTO O PRESUNTO)                      Sì                                            NO                     

Data, \_\_\_\_\_                      Firma \_\_\_\_\_  
paziente (genitore/tutore)

Ad uso interno:

Il paziente è stato identificato per due volte con diverse modalità.

Firma dell'operatore \_\_\_\_\_                      Firma del medico \_\_\_\_\_